

dr. W. De Vos
dr. J. Jonkergouw
prof. dr. N. Nadjmi
dr. L. Renier
dr. S. Stevens
dr. B. Vanassche
dr. J. Van de Perre
dr. M. Van Genechten
dr. G. Van Hemelen
dr. F. Vanhove
dr. H. Vercruyssen
dr. H. Jr. Vercruyssen
dr. P. Winderickx

AZ MONICA Antwerpen
Harmoniestraat 68
2018 Antwerpen
T 03 240 26 11
mka@azmonica.be

AZ MONICA Deurne
Florent Pauwelslei 1
2100 Deurne
T 03 320 58 18
info@aangezicht.be

UZA
Wilrijkstraat 10
2650 Edegem
T 03 821 34 47
mka@uza.be

AZ KLINA
Augustijnslei 100
2930 Brasschaat
T 03 650 50 96
secretariaat.mka@klina.be

H. Hartziekenhuis
Mechelsestraat 24
2500 Lier
T 03 491 27 36
mkasecr@hhzhlier.be

AZ Rivierenland
's Herenbaan 172
2840 Rumst
T 03 880 91 93
mka@hfr.be

Extracties

U heeft een chirurgische ingreep ondergaan op de dienst Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie. Graag geven we u dan ook enkele raadgevingen mee voor een comfortabel herstel. Uw behandeling loopt verder tot een volledige genezing bekomen is. U bent dus altijd welkom.

Het optreden van zwelling ter hoogte van de wangregio is mogelijk en kan toenemen tot en met de 2^e dag na de operatie. De zwelling van de wang zal minder uitgesproken zijn als u de eerste uren na de behandeling de wang koelt met een ijskompres of coldpack.

De wonde wordt gehecht met resorbeerbare draad, welke verdwijnt na een 10-tal dagen. De eerste 12-24uur is lichtjes nabloeden mogelijk. De tong weghouden van het wanggebied is noodzakelijk.

Uw voorschrift bevat pijnstillers en mondspoelmiddel: de verdoving is na 2 tot 4 uur uitgewerkt. Het is dan ook aan te raden om ongeveer 1 uur na de behandeling de voorgeschreven pijnmedicatie op te starten. De eerste 24u na de operatie mag men niet spoelen, zuigen op de wonde of roken; dit veroorzaakt afbraak van bloedklonter(s) en kan leiden tot nabloedingen.

Mondhygiëne is zeer belangrijk. De tanden dienen normaal verder geïetst te worden, eventueel met een zachte kindertandenborstel.

Vermijd hete dranken en/of voeding in de eerste 24u na de operatie. Voldoende eten, de eerste dagen kan u best aangepaste voeding (zachte voeding) nemen, drinken en rusten, dit versnelt het genezingsproces, het is vanzelfsprekend dat dit de 1^e dagen wat moeilijker gaat omwille van de zwelling.

Wanneer er onverwachts toch nog problemen zouden ontstaan waarover u zich zorgen maakt, aarzel dan niet om ons telefonisch te contacteren.

Het MKA-team