

dr. W. De Vos  
dr. J. Jonkergouw  
prof. dr. N. Nadjmi  
dr. L. Renier  
dr. S. Stevens  
dr. B. Vanassche  
dr. J. Van de Perre  
dr. M. Van Genechten  
dr. G. Van Hemelen  
dr. F. Vanhove  
dr. H. Vercruyssen  
dr. H. Jr. Vercruyssen  
dr. P. Winderickx

**AZ MONICA Antwerpen**  
Harmoniestraat 68  
2018 Antwerpen  
T 03 240 26 11  
mka@azmonica.be

**AZ MONICA Deurne**  
Florent Pauwelslei 1  
2100 Deurne  
T 03 320 58 18  
info@aan gezicht.be

**UZA**  
Wilrijkstraat 10  
2650 Edegem  
T 03 821 34 47  
mka@uza.be

**AZ KLINA**  
Augustijnslei 100  
2930 Brasschaat  
T 03 650 50 96  
secretariaat.mka@klina.be

**H. Hartziekenhuis**  
Mechelsestraat 24  
2500 Lier  
T 03 491 27 36  
mkasecr@hhzhlier.be

**AZ Rivierenland**  
's Herenbaan 172  
2840 Rumst  
T 03 880 91 93  
mka@hfr.be

## Plaatsen implantaten

U heeft een chirurgische ingreep ondergaan op de dienst Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie. Graag geven we u dan ook enkele raadgevingen mee voor een comfortabel herstel. Uw behandeling loopt verder tot een volledige genezing bekomen is. U bent dus altijd welkom.

Het optreden van zwelling ter hoogte van de wangregio is mogelijk en kan toenemen tot en met de 3<sup>e</sup> dag na de operatie. De zwelling van de wang kan minder worden als u de eerste uren na de behandeling de wang koelt met een ijskompres of coldpack.

De wonde wordt gehecht met resorbeerbare draad, welke verdwijnt na een aantal dagen. De eerste 12-24 uur is lichtjes nabloeden mogelijk. De tong weghouden van het wanggebied is noodzakelijk.

Uw voorschrift bevat pijnstillers, antibiotica en mondspoelmiddel: de verdoving is na 2 tot 4 uur uitgewerkt. Het is dan ook aan te raden om ongeveer 1 uur na de behandeling de voorgeschreven pijnmedicatie op te starten. De antibioticakuur dient uitgenomen te worden. De eerste 24u na de operatie mag men niet spoelen, zuigen op de wonde of roken; dit veroorzaakt afbraak van bloedklonter(s) en kan leiden tot nabloedingen.

Soms is postoperatief een doofheidsgevoel of 'veranderd' gevoel in de onderlip langs 1 zijde te merken. Dit is praktisch altijd tijdelijk en verdwijnt binnen enkele dagen tot weken. Indien er reeds genezingskapjes (door het tandvlees) op de implantaten geplaatst zijn en deze wat los komen dient u met ons contact op te nemen, ook indien dit geen pijn of last veroorzaakt.

Mondhygiëne is zeer belangrijk. De tanden dienen normaal verder gepoetst te worden, eventueel met een zachte kindertandenborstel.

Vermijd hete dranken en/of voeding in de eerste 24u na de operatie. Voldoende eten, de eerste dagen kan u best aangepaste voeding (zachte voeding) nemen, drinken en rusten, dit versnelt het genezingsproces, het is vanzelfsprekend dat dit de 1<sup>e</sup> dagen wat moeilijker gaat omwille van de zwelling.

Wanneer er onverwachts toch nog problemen zouden ontstaan waarover u zich zorgen maakt, aarzel dan niet om ons telefonisch te contacteren.