

dr. W. De Vos  
dr. J. Jonkergouw  
prof. dr. N. Nadjmi  
dr. L. Renier  
dr. S. Stevens  
dr. B. Vanassche  
dr. J. Van de Perre  
dr. M. Van Genechten  
dr. G. Van Hemelen  
dr. F. Vanhove  
dr. H. Vercruyssen  
dr. H. Jr. Vercruyssen  
dr. P. Winderickx

**AZ MONICA Antwerpen**  
Harmoniestraat 68  
2018 Antwerpen  
T 03 240 26 11  
[mka@azmonica.be](mailto:mka@azmonica.be)

**AZ MONICA Deurne**  
Florent Pauwelslei 1  
2100 Deurne  
T 03 320 58 18  
[info@aangezicht.be](mailto:info@aangezicht.be)

**UZA**  
Wilrijkstraat 10  
2650 Edegem  
T 03 821 34 47  
[mka@uza.be](mailto:mka@uza.be)

**AZ KLINA**  
Augustijnslei 100  
2930 Brasschaat  
T 03 650 50 96  
[secretariaat.mka@klina.be](mailto:secretariaat.mka@klina.be)

**H. Hartziekenhuis**  
Mechelsestraat 24  
2500 Lier  
T 03 491 27 36  
[mka@hhzhlier.be](mailto:mka@hhzhlier.be)

**AZ Rivierenland**  
's Herenbaan 172  
2840 Rumst  
T 03 880 91 93  
[mka@hfr.be](mailto:mka@hfr.be)

## Sluiten van een buccosinusale verbinding

U heeft een chirurgische ingreep ondergaan op de dienst Mond-, Kaak- en Aangezichts chirurgie. Graag geven we u dan ook enkele raadgevingen mee voor een comfortabel herstel. Uw behandeling loopt verder tot een volledige genezing bekomen is. U bent dus altijd welkom.

De wonde wordt gehecht met resorbeerbare draad, welke verdwijnt na een 10tal dagen. De eerste 12-24uur is lichtjes nabloeden mogelijk. Tong weghouden van de extractiewonde(n).

Uw voorschrift bevat pijnstillers, antibiotica en mondspoelmiddel: neem de pijnstillers die u nodig heeft en zolang u ze nodig heeft. Antibioticakuur dient uitgenomen te worden. De eerste 24u na de operatie niet spoelen, zuigen op de wonde of roken, dit veroorzaakt afbraak van bloedklonter(s) en leidt tot nabloedingen.

De eerste 2 weken mag u de neus niet snuiten, en wanneer u moet niezen doet u dat best met de mond open zodat er geen druk op de sinussen komt. Het is van belang dat uw neus goed doorgankelijk is. Indien nodig gebruikt u neusdruppels of neusspray Sterimar.

Mondhygiëne is zeer belangrijk. Tand en tanden dienen normaal verder gepoetst te worden, eventueel met een zachte kindertandenborstel.

Vermijd hete dranken en/of voeding in de eerste 24u na de operatie. Voldoende eten, de eerste dagen kan u best aangepaste voeding (zachte voeding) nemen, drinken en rusten, dit versnelt het genezingsproces, het is vanzelfsprekend dat dit de 1<sup>e</sup> dagen wat moeilijker gaat omwille van de zwelling.

Wanneer er onverwachts toch nog problemen zouden ontstaan waarover u zich zorgen maakt, aarzel dan niet om ons telefonisch te contacteren.

Het MKA-team